


Pracownia Diagnostyki Endoskopowej UCMMIT

ul. Powstania Styczniowego 9B, Gdynia, tel.58 699 85 66

Rejestracja tel.58 699 85 75

Data badania:

Godzina:



Przygotowanie do badania

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

Do badania należy przygotować się **lekami przeczyszczającymi**.

Preparaty przeczyszczające takie jak: Moviprep, Fortrans, Eziclen, CitraFleet, Clensia itp. są pełnopłatne i dostępne w aptece na podstawie recepty. Receptę wystawia lekarz kierujący na badanie.

Schemat dawkowania leku przeczyszczającego:

Przygotowany lek przeczyszczający należy podzielić na 2 części.

Jedną część należy rozpuścić (zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu) i wypić o godzinie 18.00 dzień przed badaniem, drugą część preparatu należy rozpuścić i wypić w dniu badania o godzinie 5.00.

Dodatkowo podczas picia preparatu przeczyszczającego należy wypić minimum 3 litry wody. Wodę można pić aż do momentu badania.

Dieta

- **Na tydzień przed badaniem:** należy odstawić pokarmy wzdymające i zawierające ziarna oraz drobne pestki (pieczywo z ziarnami, musli, winogrona, siemię lniane, pomidory, truskawki itp.)
- **Dzień przed badaniem:** należy przestrzegać diety płynnej (np. galaretki, klarowny bulion, płynny kisiel). Można przyjmować płyny w postaci wody mineralnej niegazowanej, soków klarownych, gorzkiej herbaty. Można ssać cukierki miętowe i jeść miód.
- **W dniu badania:** Do czasu badania nie wolno spożywać pokarmów, można natomiast pić wodę i lekką herbatę bez cukru, aż do czasu badania.



Leki

- Ustalić z kardiologiem, czy można odstawić leki przeciwkrzepliwe i przeciwplatekcyjne, np.: Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Plavix.
- Leki na nadciśnienie i na padaczkę przyjąć o godzinie 6.00 rano w dniu badania, popijając niewielką ilością wody.
- W dniu badania nie należy przyjmować leków na cukrzycę (leków doustnych i insuliny).
- W przypadku cukrzycy typu 1 należy zmodyfikować dawki insuliny po kontakcie z diabetologiem.
- **Nie ma konieczności** odstawiania Aspiryny (Acard, Polocard).

Uwagi

- Należy dostarczyć wyniki poprzednich kolonoskopii wraz z wynikami badania histopatologicznego, ewentualnie informacje o przebytych operacjach na jamie brzusznej. **Konieczne lista przyjmowanych leków.**
- Zalecamy zgłoszenie się na badanie z osobą towarzyszącą.
- Po badaniu nie należy prowadzić samochodu.
- **Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.**

Wyznaczona orientacyjna godzina rozpoczęcia badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.